

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Bonn.

Direktor: Professor Dr. Freiherr v. Redwitz.

Die Behandlung der Haemangiome mit Radium und ihre Ergebnisse.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 19. November 1936

von

Friedrich Tünnerhoff

aus H a g e n i. W.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Janker.

Korreferent: Prof. Dr. Freiherr v. Redwitz.



In Dankbarkeit
meinen verstorbenen Eltern
und meinem Onkel Wilhelm!

Gliederung.

1. Kapitel:
Begriffsbestimmung der Haemangiome, ihre anatomischen Grundlagen und klinischen Erscheinungsbilder.
2. Kapitel:
Die Radiumstrahlen, ihre Wirkung auf das Gewebe und ihre Anwendungstechnik.
3. Kapitel:
Positive und negative Strahlenwirkung — Bericht über die Heilergebnisse — Bemerkenswerte Krankengeschichten — Die makroskopisch erfaßbaren Veränderungen im Verlauf des Heilprozesses und ihre kritische Auswertung — Unterschiede in den Heilerfolgen.
4. Kapitel:
Negative Strahlenwirkung — Resistenz — Wachstumszunahme — Rezidiv, Entartung und Metastase — Radiumschäden.
5. Kapitel:
Gesichtspunkte in der Behandlung der Haemangiome — Vor- und Nachteile der Radiumbehandlung gegenüber anderen Behandlungsmethoden — Zusammenfassung der Behandlungsergebnisse und der Schlußfolgerungen — Der Indicationsbereich des Radiums.

Die Beobachtung der unterschiedlichen Heilerfolge in der Behandlung von Blutgeschwülsten mit Radium kann unter anderem auch auf den mannigfaltigen Bau der Gebilde hinweisen, die Klinik und Pathologie unter dem Namen „Haemangiome“ zusammenfassen. Diese Gebilde sind aus Blutgefäßen und Bindegewebe aufgebaut. Virchow versteht unter Haemangiomen Geschwülste, die wesentlich aus neugebildeten Gefäßen oder aus Gefäßen mit neugebildeten Elementen ihrer Wand bestehen. Demnach, so schließt B ö r f t, ist nur ein angioblastischer Tumor ein Angiom. Alle anderen Bildungen, die wir als Haemangiome anprechen, wären dann nur fehlerhafte Gewebszusammensetzungen. So kann z. B. eine mangelhafte Verbindung epithelialer und mesenchymaler Gewebs-teile eine ungewöhnliche Gefäßausbildung hervorrufen und so den Charakter eines Haemangioms haben, und doch ist eine solche Bildung keine Geschwulst, sondern eine Hamartie. Ektatische Veränderungen präexistenter Gefäße, neugebildete Bestandteile der Gefäßwandungen, die Verbindung von ektatischen Veränderungen mit gleichzeitiger Neubildung von Gefäßwandelementen oder ein Überwuchs an umschriebener Stelle einer Hautpartie, ausgehend von einer Anlage — ungefähr nach K y r l e — all das kann in mannigfaltiger Verbindung das sehr variante klinische Bild einer Blutgefäßgewbgeschwulst hervorrufen. Entsprechen nun diesen Bildern bestimmte pathologisch-histologische Formen?

Am Aufbau der Haemangiome sind Arterien, Venen und Kapillaren für sich und gemischt in wechselnder Weise beteiligt. Es handelt sich dabei wohl nicht nur um eine umschriebene Erweiterung normaler Gefäßbezirke, sondern es liegt unzweifelhaft auch Neubildung vor (R i b b e r t, Geschwülste). Die Unterscheidung in Haemangioma arteriosum und venosum ergibt Einteilungsmöglichkeiten, doch sie erscheint nicht immer berechtigt. Schon makroskopisch betrachtet, kann die stark dickwandige Veränderung der Gefäße zu Trugschlüssen führen. Auch die mikroskopische Untersuchung kann infolge der Alteration, die die Blutgefäßgewbgeschwülste oft erleiden, Zweifel über die Natur der beteiligten Gefäße ergeben (B o r f t). Doch es gibt Blutgeschwülste, die entweder rein arteriell oder doch wesentlich arteriell aufgebaut sind. Hier wäre zunächst als einfachste Veränderung an einer Schlagader die Erweiterung des Arterienrohres zu nennen ohne Änderung der charakteristischen

Grundstruktur, vielleicht lediglich mit einer gewissen Hypertrophie einzelner Elemente. Eine solche Veränderung kann schon wie ein Blutschwämmchen aussehen. Es handelt sich aber um eine einfache Arteriektafie, die J o r e s u. a. von den Aneurysmen trennen. Eine oft rein arteriell aufgebaute Geschwulst ist eine Bildung aus rankenartig angeordneten Gefäßen. Doch kann die Zusammensetzung auch wechseln. Es kommt sowohl rein arteriell, als auch gemischt arteriell venöser und teils auch rein venöser Aufbau vor. Die Rankengefäßgeschwulst, Haemangioma racenosum, ist wohl aus Endgefäßerweiterungen hervorgegangen. An der Neubildung beteiligen sich alle Wandelemente. Nach V i r c h o w und R i b b e r t handelt es sich um eine echte Gefäßgeschwulst, B o r s t glaubt dagegen, daß es sich um einen kongenital angelegten Überschuß von Gefäßen, also eher um eine Hamartie handelt.

Auch bei den Venen ergeben sich gewisse Einteilungsmöglichkeiten. B e n d a teilt Erweiterungen der Venen in drei Gruppen ein:

Diffus gleichmäßig erweiterte Venen = Phlebektasien;

Diffus ungleichmäßige Erweiterung mit ampullären Ausbuckungen = Varikositäten;

Phlebektasien und Varikositäten umschriebener Venengebiete, die durch Verdrängung und Ufur der einbettenden und benachbarten Gewebe Geschwulstcharakter annehmen = venöse Angiome.

Schon die einfache Phlebektasie hält V i r c h o w für den Ausdruck einer gewissen Hypertrophie. Die mikroskopische Betrachtung ergibt hierbei häufig Proliferation der Wandelemente. Es verbreitert sich die Media, die Intima zeigt einen bindegewebigen Überschuß, und in die Endothelschicht schieben sich wuchernde Kollagenlagen (nach N o b e l). Die Varikositäten interessieren in dieser Arbeit weiter nicht. Die bisher beschriebenen rein arteriell und venösen Veränderungen können — makroskopisch betrachtet — schon den Eindruck einer Blutgefäßgewebgeschwulst machen.

Die eigentlichen Neubildungen an den Blutgefäßen müssen wir in gutartige und bösartige Geschwülste einteilen. Unter den Blutgefäßgewebgeschwülsten ist am häufigsten die Teleangiektasie, die Endgefäßerweiterung, die sich hauptsächlich aus weiten kapillarähnlichen Gefäßen zusammensetzt. Es handelt sich um eine Neubildung, deren Wachstum zwar langsam, aber doch oft ständig vor

sich geht. Meist liegt diese Gefäßerweiterung in der Haut und ist von der Epidermis durch eine Schicht dünnen Gewebes getrennt. Nach unten dringt diese Geschwulst zwischen die Grenzen der Fettgewebsläppchen ein. Die Haargefäße sind mit Endothelien ausgekleidet. In die Geschwulstläppchen sind Schweißdrüsen und Haarbälge eingeschlossen. Die Teleangiektasien treten mit den Gefäßgebieten der Nachbarschaft in keinen oder in nur höchst mangelhaften Zusammenhang. Dadurch, daß stets neue Gefäße erzeugt werden, die in die Nachbarschaft vorsprossen, wächst diese Geschwulst und kann evtl. benachbarte Gewebe zerstören. So kann auch diese an sich gutartige Neubildung einmal in ihrem Wachstum bösartig werden.

Gewisse Blutgefäßgewebsgeschwülste treten meist bei älteren Patienten in Form von Warzen auf. Sie heißen senile Angiome und sind aus einem Knäuel vielfach geschlängelter Haargefäße gebaut und liegen meist in Höhe der Haut oder nur wenig darüber. Außer der zuführenden Arterie und der abführenden Vene stehen die senilen Angiome mit der Nachbarschaft wohl in keiner Verbindung.

Erweitern sich die Kapillaren erheblich, so daß buchtige Hohlräume entstehen, so sprechen wir von einer kavernösen Blutgefäßgewebsgeschwulst. Die Hohlräume sind mit Endothel ausgekleidet und fließen ineinander über. Ihr Inneres ist mit Blut und Thromben verschiedenster Art und Herkunft ausgefüllt. Die kavernösen Blutgefäßgewebsgeschwülste kommen überall vor. Eine besondere Stellung nehmen die Cavernome der Leber ein, auf die in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden soll.

Die bisher beschriebenen Formen der Blutgefäßgewebsgeschwülste können, ohne in ihrem Bau an sich bösartig zu werden, schon durch ihren Sitz und ihr Wachstum einmal lebensbedrohend werden. B o r s t beschreibt in seiner Pathologie der bösartigen Geschwülste aber auch eine blutreiche schwammige, weiche Neubildung von atypischen Bau, bei der die Wände der Haargefäße nicht mit einer einfachen Lage platter Endothelien, sondern aus zahlreichen unregelmäßigen Zellen gebildet wird. Daneben befinden sich in den Proliferationszentren dieser Neubildungen solide Zellstränge, die oft miteinander netzartige Verbindungen eingehen. An Stelle des geschlossenen angioblastischen Wachstumsbildes entsteht so das Bild eines gewöhnlichen zellreichen Sarkoms. Es ist das

Haemangioendothelioma malignum. Davon wird noch oft das maligne Angiom getrennt, ein typischer angioblastischer Tumor, der aber Metastasen setzt. Ob diese Unterscheidung berechtigt ist, erscheint fraglich. Hinsichtlich der Annahme der Metastasierung scheint Vorsicht angezeigt, da bekannt ist, daß diese Bildung die Neigung hat, primär gehäuft aufzutreten. Die Pathologie unterscheidet also gutartige Blutgefäßgewebsgeschwülste und bösartige Blutgefäßgewebsgeschwülste und teilt sie ein:

Teleangiektasie

Haemangioma racenosum

Haemangioma fenile

Haemangioma cavernosum

Haemangioendothelioma malignum

Haemangioma malignum.

Auch die Klinik trennt grundsätzlich gutartige Blutgefäßgewebsgeschwülste von bösartigen. Die Therapie der bösartigen Geschwülste besteht in einer möglichst frühzeitigen radikalen Exstirpation. Das klinische Bild der gutartigen Haemangiome erscheint viel mannigfaltiger als deren pathologisch-histologisches Bild: Das leuchtet ein, wenn man lediglich bedenkt, daß eine exstirpierte Blutgefäßgewebsgeschwulst unter dem Mikroskop oft nur blutleere Maschen zeigt, während beim lebenden Menschen das jeweilige Aussehen einer Blutgefäßgewebsgeschwulst von vielen Faktoren abhängig sein kann. Zunächst spielt der Sitz einer Blutgefäßgewebsgeschwulst eine Rolle. Die Lokalisation an Schleimhäuten oder an einfacher Haut, und hier wieder der unterschiedliche Sitz in Haut oder Unterhaut kann zu verschiedenen Bildern führen.

In besonders hohem Grade ist das Aussehen einer Blutgefäßgewebsgeschwulst von dem Verhalten des Patienten abhängig. Ein Haemangioma cavernosum kann sich z. B. beim Schreien oder Pressen prall mit Blut füllen und sich stark vorbeugen. Menstruation, Krankheiten etc., all diese Einflüsse können ein und demselben Haemangiom zeitlich unterschiedliches Aussehen geben.

Auch die Umwelt spielt eine gewisse Rolle. Unterschiedliche Temperaturen, psychische Einflüsse, ferner mechanische, thermische und chemische Reize können z. B. ein an sich nicht sonderlich gefärbtes Mal intensiv rot erscheinen lassen.

Zusammenfassend kann man sagen, daß der pathologisch-histologische Bau — mag es sich um eine Ektafie, eine Gefchwulst oder eine Hamartie handeln — die Lokalisation der Blutgefäßgewebsgeschwülste, das Verhalten und auch das Alter der Patienten und die Umweltseinflüsse zusammen zu den varianten klinischen Bildern der Haemangiome führen, auf deren wichtigste Erscheinungsformen nun kurz eingegangen werden soll.

Das Haemangioma simplex — mit einer nicht immer berechtigten Unterscheidung in Haemangioma simplex arteriosum und Haemangioma simplex venosum tritt häufig als kompressibler Tumor mit zeitweiliger Pulsation in Erscheinung. Oder das Haemangioma simplex liegt flächenhaft in Höhe der Haut als intensiv rot gefärbtes Feuermal und heißt dann Naevus flammeus. Hierher gehören auch die blassen Feuermäler, die auf Druck verschwinden und die offenbar aus Erweiterungen des subkutanen Venennetzes bestehen. Spinnenförmig ausgebreitet ist der Naevus araneus, ein knotenförmiges Gefäßmal mit speichenförmigen Gefäßreiserchen. Mehr bei Männern als bei Frauen, hauptsächlich nach dem dreißigsten Lebensjahre tritt das senile Angiom auf. Es liegt meist in der Höhe der Haut oder nur wenig darüber. — Das Schrifttum berichtet noch von den verschiedensten Erscheinungsformen, in denen das Haemangioma simplex auftritt. Aber diese Formen haben wegen ihrer Seltenheit weniger Bedeutung.

Eine Anzahl Blutgefäßgewebsgeschwülste erwecken den Eindruck eines lappigen Gefäßschwammes. Sie liegen in der Haut oder Unterhaut oder besitzen teils rauhe, teils glatte Oberfläche. Mit Recht tragen solche Bildungen den Namen Haemangioma cavernosum. Oft überragen bestimmte Formen des Haemangioma cavernosum das Niveau der Haut so weit, „daß sie überhängen“. Solche polypösen Haemangiome besitzen bisweilen die Fähigkeit der Erektilität. Manchmal zeigen sie eine dem Arterienpuls gleichzeitige Pulsation, nach Virchow ein Beweis, daß der Blutzufluß durch Erweiterung der zuführenden Arterien geschieht. Ihre Größe wechselt von Stecknadelkopfgröße bis zur Mannsfaustgröße. Bei Frauen findet sich bisweilen eine kavernöse Blutgefäßgewebsgeschwulst von elastischer Beschaffenheit in perigenitaler Anordnung als Angiofibroma circumscriptum multiplex. Hauptsächlich in diesen drei Unterscheidungsformen tritt das Haemangioma cavernosum auf.

Das Schrifttum erwähnt noch mannigfaltige Formen des Haemangioma cavernosum, so z. B. das selten vorkommende Haemangioma racenosum, ein unter der Haut gelegenes Knäuel vielfach gefchlängelter Arterien und Venen. Eine Aufzählung all der Gebilde, die den Anhang der großen Haemangiomfamilie bilden, würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Sie ist auch für die gestellte Aufgabe, über die Heilerfolge bei Behandlung von Blutgefäßgewebsgeschwülsten mit Radium zu berichten, belanglos; Gebilde, wie z. B. Angioceratoma digitorum acroasphycticum oder genuine diffuse Phlebarteriektafie habe ich bei Durchsicht der Krankenblätter auch nicht vorgefunden.

Über die bösartigen Geschwülste sind schon Ausführungen gemacht. Klinisch äußert sich die Bösartigkeit meist nur in einem rapiden Wachstum, doch kann auch ein in seinem Bau gutartiges Haemangiom in seltenen Fällen mal durch Blutungen oder durch Infektion mit anschließender Septikämie lebensbedrohend werden. Darüber folgen später noch nähere Angaben.

Bisweilen kommen Haemangiome vergesellschaftet mit anderen Geschwülsten und auch körperlichen Mißbildungen vor; letzteres bei manchen Haemangiomen vielleicht als Hinweis auf die Entstehung und Ursache dieser Bildungen.

Nicht selten finden sich im Schrifttum und auch bei den von mir durchgesehenen Haemangiomfällen Angaben über Patienten, die nicht nur ein Haemangiom an umschriebener Stelle haben, sondern die mehrere Haemangiome an den verschiedensten Körperstellen haben. Zweckmäßig erschien nun, um zu versuchen, eine Übersicht über die oft unterschiedliche Strahlenreaktion der einzelnen Haemangiome bei ein und demselben Patienten zu bekommen, dabei folgende Einteilung:

1. Gruppe: Patienten mit nur einem Haemangiom.
2. Gruppe: Patienten mit zwei oder mehreren Haemangiomen:
 - a) Patienten mit einem zentralen Haemangiom und ein oder mehreren diesem benachbart liegenden Haemangiomen.
 - b) Patienten mit mehreren gleich großen Haemangiomen an umschriebener Stelle.
 - c) Patienten mit je einem Haemangiom an symmetrischen Stellen.

- d) Patienten mit Haemangiomen, die getrennt über die gesamte sichtbare Körperoberfläche einschließlich der sichtbaren Schleimhäute — mit Ausnahme der Cornea und des Knorpels — verteilt sind.

Blutgeschwülste an gewöhnlich nicht sichtbaren Stellen, wie an inneren Organen und Körperhöhlen mit Ausnahme der Mund- und eines Teils der Rachenhöhle werden in dieser Arbeit nicht weiter behandelt. Das Schrifttum erwähnt die Koexistenz von äußeren Haemangiomen und angiomatösen Veränderungen am Gehirn, mit kavernösen Gebilden in der Leber und anderem mehr.

Ob und inwiefern Korrelationen zwischen solchen Gebilden und Haemangiomen an der Körperoberfläche bestehen, ist unbestimmt; für die Therapie ist es wohl nicht gleichgültig.

Unter dem Einfluß der Entdeckung der Röntgenstrahlen hat die Forschung nach weiteren Strahlen gesucht, die ähnliche Wirkungen wie die Röntgenstrahlungen haben könnten.

Madame Curie fand bei der Untersuchung von strahlenaussendenden Stoffen ein Element, das Radium. Radium sendet ständig drei Arten von Strahlen aus:

α -Strahlen. Es sind doppelt positiv elektrisch geladene Heliumatome. Wegen ihrer großen Masse werden sie auf ihren Wegen an allen Widerständen leicht abgebremst, haben also keine große Reichweite. Da wir für die Therapie das Radium in Stäbchen zu 2 mg, 5 mg und 10 mg in einen Messingträger legen, der als Filter wirkt, fallen die α -Strahlen für die Therapie fort.

β -Strahlen, haben manches mit den α -Strahlen gemeinsam, sind aber sonst völlig verschieden. Sie besitzen eine große Reichweite, fallen aber für die Therapie ebenfalls aus. Neuere Versuche, die β -Strahlen in Form von dicken Radiumspicknadeln oder in Form einer uranhaltigen Suspension zur intratumoralen Injektion für therapeutische Zwecke zu verwenden, haben bisher keinen besonderen Erfolg gehabt.

γ -Strahlen sind Röntgenstrahlen von größerer Geschwindigkeit. Sie unterscheiden sich von den α - und β -Strahlen dadurch, daß sie keine korpuskulären Strahlen sind, sondern Schwingungsphänomene, die infolge von explosivartigen Erschütterungen

des Äthers auftreten. Im Gegensatz zu den α - und β -Strahlen sind sie durch den Magneten nicht ablenkbar, da sie keine elektrische Ladung haben. Sie besitzen ein stärkeres Durchdringungsvermögen. Diese Strahlen benutzen wir in der Radiumtherapie.

Eine wirkfame Strahlentherapie ist nun nur möglich, wenn es gelingt, soviel γ -Strahlen an das Haemangiom zu bringen, daß diese dort eine biologische Wirkung ausüben können. Die Radiumstrahlen pflanzen sich geradlinig fort. So wie sie auf das Haemangiom und seine Umgebung auftreffen, wird ein Teil der Radiumstrahlen gestreut. Es entsteht einmal die klassische Streuung. Sie ist aber weniger wichtig als die Comptonstreuung. Bei ihr wird der Strahl beim Auftreffen abgelenkt. Das getroffene Elektron des Atoms erhält gleichzeitig einen Impuls und ändert seine Bewegung. Dabei wird Energie abgegeben, der Strahl wird weicher, also auch langwelliger. Diese Energieumwandlung erklärt vielleicht die Wirkung der kurzwelligen γ -Strahlen, denn die oben beschriebene Energieumwandlung erzeugt gleichzeitig eine biologische Wirkung, die sich noch zu der biologischen Wirkung addiert, die die nicht abgelenkten γ -Strahlen hervorrufen. Geringste Strahlenmengen haben eine belebende Wirkung auf Zellprozesse. Größere Strahlenmengen führen zu einer Schädigung der Zellen und bei ausreichender Dosis zum Zelltod. Plasma und Zellkern werden getroffen. Seitz und W i n t z haben für das menschliche Gewebe eine Empfindlichkeitskala aufgestellt, aus der unter anderem hervorgeht, daß jugendliche Zellen mit großer produktiver Kraft und zahlreichen Mitosen wird Energie abgegeben, der Strahl wird weicher, also auch langstrahlenempfindlicher sind, als ausgereifte gesunde Zellen, ein Hinweis, der vielleicht die so verschiedene Reaktionsweise der einzelnen Blutgefäßgewebsgeschwülste verständlich machen kann. Die Wirkung der äußern sich die obliterierenden Veränderungen an Venen und Arterien hauptsächlich darin, daß in steigendem Maße das Bindegewebe unter dem Endothel zunimmt und die Media dadurch verdickt. An den Arterien erkennt man das Schwinden der Elastica und ihren Ersatz durch hyaline Massen. Die Verdickung der Intima besteht aus Bindegewebe und viel kollagener Interzellularsubstanz. An Stelle des Endothels sieht man oft geschwollene und vakuolierte Zellen, die wie Büschel in die Gefäßlumen hineinragen. Vergleicht

man einen Schnitt aus einem nicht bestrahlten Haemangiom mit einem Schnitt aus demselben nunmehr bestrahlten Haemangiom, so kann man nach Wertheim feststellen, daß sich das Haemangiom gleichsam auf dem Wege seiner Entwicklung dergestalt verändert, daß sich eine paraembryonale Metaplasie des Gefäßbindegewebsapparates vollzogen hat unter Hyperplasie seiner Elemente, also keine eigentliche Zerstörung der Elemente, die das Haemangiom bilden. Die Gefäße wandeln ihre Elemente in junge Fibroblasten um, die stark vermehrt, daß Gefäßlumen verstopfen. In diesem jungen heranreifenden Gewebe ordnen sich die sternförmigen Zellen reihenförmig an, verlieren die protoplasmatischen Fortsätze; ihr Plasma vermindert sich. So entstehen kollagene und elastische Fasern, die zur Verödung der Gefäße führen und neues, nicht haemangiomatöses Gewebe bilden. Welche Radiummengen sind nun notwendig, um solche Wirkungen, die die Abheilung der Haemangiome herbeiführen, auszulösen?

In der biologischen Maßmethode hat man als Maß eine Hauterythemdosis = HED festgesetzt, das ist eine Strahlenmenge, die, auf die Haut gebracht, nach acht Tagen eine leichte Rötung und nach vier bis sechs Wochen eine leichte Bräunung hervorruft. Wieviel Prozent einer solchen HED sind nötig, um eine wirksame Therapie bei Blutgefäßgewebsgeschwülsten durchzuführen? Die Bonner Klinik führt mit ihren Radiummengen keine Fernbestrahlung durch. Sie bringt das gefilterte Radium direkt an die Oberfläche des Haemangioms. Dadurch ist die Intensität an der Oberfläche ziemlich groß, was den Nachteil hat, daß es so leicht zu Schädigungen des anliegenden gesund aussehenden Gewebes kommen kann. Andererseits wirkt sich jedoch recht günstig aus, daß die Tiefenwirkung bei der Kontaktbestrahlung verhältnismäßig geringer ist als bei der Abstandsbestrahlung, daß also wohl nur die angiomatösen Veränderungen in Cutis und Subcutis getroffen werden, nicht aber das tiefergelegene gesunde Gewebe. Für gewöhnlich wird nun die Strahlendosis beim Radium durch Multiplikation der mg Radiumelement mit der Bestrahlungszeit ausgedrückt. Das ist ein sehr ungenaues Maß. Denn es leuchtet ein, daß z. B. 50 mg Radium zehn Minuten lang angewandt, andere Wirkungen haben, als 10 mg Radium 50 Minuten lang angewandt. Die Frage, wieviel Radium zu einer wirksamen Therapie für Blutgefäßgewebs-

geschwülste notwendig ist, läßt sich generell nicht beantworten durch Angabe einer bestimmten Radiummenge und durch Angabe einer bestimmten Bestrahlungszeit als gleich günstig wirksam für alle Haemangiome; denn die Beobachtung lehrt, daß ein und dieselbe Strahlenmenge in demselben Zeitabschnitt und mit der gleichen Bestrahlungszeit, auf verschiedene Haemangiome verabfolgt, auch verschiedene Wirkungen haben. Das leuchtet ein, wenn man lediglich bedenkt, daß junges, nicht ausgereiftes Gewebe ja auf Strahlen besser anspricht, als ausgereiftes Gewebe.

Die Bestrahlungstechnik der Radiumabteilung der Bonner Chirurgischen Klinik wendet das Radium wie folgt an: Eine bestimmte Radiummenge wird in den zugehörigen Messingträger gelegt, der oben durch eine Bleiplatte verschlossen wird. Zum sicheren Verschluss wird über die so geschlossene Messingkassette ein Gummifingerling gestreift, angezogen und fest zugebunden. Für therapeutische Zwecke kommen nur die γ -Strahlen in Frage. Die α - und β -Strahlen werden durch das Messing = Primärfilterung und durch den Gummiüberzug = Sekundärfilterung, abgefiltert. Im Durchschnitt sind bei der einzelnen Bestrahlung 60 mg Radium 20 Minuten lang angewandt worden. Die Dosierung richtete sich häufig nach dem gerade zur Verfügung stehenden Menge Radiumelement. Bei den zur Besprechung stehenden 146 Haemangiomfällen ist die Therapie in keinem Falle mit verfenkten Radiumnadeln in Form von Spickung oder durch intratumorale Injektion einer radioaktiven Suspension durchgeführt worden. Bei einigen Haemangiomen, die durch normal aussehende Hautpartien voneinander getrennt und so mehr aus haemangiomatösen Feldern bestanden wie bei Haemangiomen, die eine ganze Körperpartie einnahmen, wie z. B. eine ganze Gesichtshälfte, ist man zwei Behandlungswege gegangen. Einmal sind solche haemangiomatösen Flächen in Felder geteilt und die einzelnen Felder getrennt für sich bestrahlt worden, oder aber man hat die Radiumbehandlung mit Hilfe der Wachsmoulage durchgeführt.

Die Moulage wird aus erwärmtem Bienenwachs so geformt, daß sie sich genau der haemangiomatösen Hauptpartie anpaßt. In dieser Moulage ist das Radium möglichst gleichmäßig verteilt. Vor Beginn der Behandlung ist eine Kontrolle über die Verteilung und Intensität notwendig, mit der die Radiumstrahlen aus der Wachs-

moulage auf das Haemangiom einwirken. Diese Kontrolle geschieht mittels der photometrischen Dosimetrie nach H o l t h u f e n :

Ein Standardfilm wird 30 Würfelminuten lang — Würfelminute = die vom Standardpräparat erreichte Schwärzung — von einem bestimmten Radiumpräparat belichtet. Dieses Radiumpräparat ist = eine Radium- γ -Strahlung eines mit 1 mm Platin gefilterten Präparates von 1,15 cm Herdlänge und 13,3 mg Gewicht. Pro Minute wirken auf den Standardfilm ein 0,04 r, ein biologisch gefundener Wert. Der Standardfilm wird also mit $30 \cdot 0,043 = 1,3$ r belichtet. Wird nun dieser so belichtete Standardfilm sechs Minuten lang in normalem Entwickler entwickelt, so entsteht eine Schwärzung, die unter Druckschrift gerade nicht mehr lesbar ist. Ferner werden Testfilme einzeln unter der Moulage in verschiedenen Zeiten belichtet. Zweckmäßig erscheinen die Zeiten 1,3—2; 6—3; 9—5; 2—6; 5—7; 8—9 usw., da diese Zahlen durch 1,3 teilbar sind. Die Testfilme werden mit dem Standardfilm verglichen. Wenn es sich nun z. B. ergibt, daß der 5,2 Minuten lang belichtete Testfilm die gleiche Schwärzung zeigt, wie der Standardfilm, so kann man schließen, daß auf beide Filme die gleiche Strahlenintensität eingewirkt hat, da die gleiche Schwärzung erreicht wurde. Es hat also die gleiche Strahlenintensität auf den gefundenen Testfilm eingewirkt. Die für die Behandlung festgesetzte r-Zahl wird dann leicht ausrechenbar sein.

Dem Bericht über die Behandlungsergebnisse liegen Aufzeichnungen über 146 mit Radium behandelte Patienten und eigene Beobachtungen zugrunde. Die beste Übersicht vermittelt eine Einteilung in zwei Gruppen. Die erste Gruppe weist positive Strahlenwirkung auf, d. h. sie enthält alle Heilungen und Besserungen, die durch die Radiumeinwirkung erzielt worden sind. Die zweite Gruppe — mit negativer Strahlenwirkung — umfaßt im Gegensatz zur ersten Gruppe alle Patienten, bei denen die Radiumbestrahlung entweder keinen Erfolg gebracht hat im Sinne einer Heilung oder Besserung, oder bei denen im Verlauf oder nach Abschluß der Radiumbehandlung sogar Schädigungen: wie Narbenbildung, Entartung, Recidivbildung und Metastasierung aufgetreten sind.

Von den 146 Patienten scheiden 20 aus, in deren Krankenblatt keine weiteren Angaben zu finden waren, die also wohl nur zur

ersten Untersuchung gekommen waren und nach der ersten Bestrahlung die Behandlung verlassen haben, ohne sich später wieder einmal vorzustellen. Der folgende Bericht, in dem nach nur 17 Fällen Gesichtspunkten Zuweisung in die beiden Gruppen erfolgt ist, wertet also die Aufzeichnung über 126 Patienten aus.

Eine gedrängte Übersicht über die Patienten, bei denen die Strahlenbehandlung positiv gewirkt hat, vermittelt Tabelle 1. In ihr sind die Anzahl der Bestrahlungen mit Durchschnittsdosis, Behandlungsdauer und die Haemangiomart (Haemangiom simplex = Hs und Haemangioma cavernosum = Hc) angegeben. Die Pfeilrichtung zeigt an, daß der Erfolg der Bestrahlung allgemein abnimmt, so daß im ersten Teil der Tabelle fast ausschließlich kosmetische Heilungen, im weiteren Verlauf mehr Ablassungen und Verkleinerungen vorkommen. Ein Sternchen weist auf Besonderheiten hin, die am Schluß der Tabelle geschildert sind.

Tabelle 1.

1.	2	Bestrahlung, mit je 60 mg Ra/20' bei H ? in 2 Monaten				
2.	4	„	„	„	„	„ H c in 12 „ *)
3.	5	„	„	„	„	„ H s in 6 „
4.	4	„	„	„	„	„ H s in 3 „
5.	5	„	„	„	„	„ H c in 5 „
6.	4	„	„	„	„	„ H c in 3 „
7.	2	„	„	„	„	„ H c in 24 „
8.	4	„	„	„	„	„ H s in 4 „ *)
9.	3	„	„	„	„	„ H s in 3 „
10.	4	„	„	„	„	„ H c in 5 „
11.	2	„	„	„	„	„ H c in 2 „ *)
12.						„ H s in 3 „
13.	3	„	„	„	„	„ H c in 3 „
14.	4	„	„	„	„	„ H s in 4 „
15.	8	„	„	„	„	„ H c in 12 „
16.	6	„	„	„	„	„ H s in 9 „
17.	5	„	„	„	„	„ H c in 7 „
18.	6	„	„	„	„	„ H s in 16 „
19.	7	„	„	„	„	„ H c in 8 „
20.	4	„	„	„	„	„ H s in 4 „
21.	8	„	„	„	„	„ H c in 12 „

22.	8	Befstrahlung, mit je 60 mg Ra/20' bei H c in 12 Monaten			
23.	7	„ „ „ „	„	H ? in 10	„ *)
24.	8	„ „ „ „	„	H c in 25	„
25.	3	„ „ „ „	„	H s in 15	„
26.	8	„ „ „ „	„	H c in 25	„
27.	6	„ „ „ „	„	H c in 12	„
28.	8	„ „ „ „	„	H c in 10	„
29.	2	„ „ „ „	„	H c in 14	„
30.	5	„ „ „ „	„	H c in 9	„
31.	2	„ „ „ „	„	H s in 6	„
32.	6	„ „ „ „	„	H s in 10	„ *)
33.	4	„ „ „ „	„	H s in 6	„
34.	9	„ „ „ „	„	H ? in 15	„
35.	8	„ „ „ „	„	H c in 15	„
36.	6	„ „ „ „	„	H c in 9	„
37.	3	„ „ „ „	„	H c in 2	„
38.	2	„ „ „ „	„	H s in 2	„
39.	7	„ „ „ „	„	H s in 15	„ *)
40.	6	„ „ „ „	„	H s in 10	„ *)
41.	5	„ „ „ „	„	H s in 7	„
42.	6	„ „ „ „	„	H s in 5	„ *)
43.	5	„ „ „ „	„	H c in 5	„
44.	7	„ „ „ „	„	H s in 8	„
45.	5	„ „ „ „	„	H ? in 6	„
46.	4	„ „ „ „	„	H s in 9	„
47.	3	„ „ „ „	„	H c in 3	„
48.	5	„ „ „ „	„	H s in 5	„ *)
49.	11	„ „ „ „	„	H s in 41	„ *)
50.	4	„ „ „ „	„	H c in 7	„
51.	5	„ „ „ „	„	H s in 11	„
52.	7	„ „ „ „	„	H s in 6	„
53.	7	„ „ „ „	„	H c in 10	„
54.	4	„ „ „ „	„	H c in 7	„ *)
55.	3	„ „ „ „	„	H c in 4	„
56.	7	„ „ „ „	„	H s in 11	„
57.	5	„ „ „ „	„	H s in 9	„ *)
58.	6	„ „ „ „	„	H s in 8	„

59.	9	Befstrahlung, mit je 60 mg Ra/20' bei H ? in 18 Mon.				*)
60.	6	"	"	"	"	" bl.Mal in 10 "
61.	3	"	"	"	"	" H s in 13 "
62.	5	"	"	"	"	" H s in 6 "
63.	8	"	"	"	"	" H s in 15 "
64.	6	"	"	"	"	" H s in 16 "
65.	4	"	"	"	"	" bl.Mal in 12 "
66.	6	"	"	"	"	" H s in 12 "
67.	6	"	"	"	"	" H s in 9 "
68.	5	"	"	"	"	" H s in 8 "
69.	3	"	"	"	"	" H c in 3 "
70.	5	"	"	"	"	" H s in 8 "
71.	17	"	"	"	"	" H c in 12 "
72.	12	"	"	"	"	" H s in 41 "
73.	6	"	"	"	"	" H s in 15 "
74.	6	"	"	"	"	" H c in 13 "
75.	11	"	"	"	"	" H s in 28 "
76.	4	"	"	"	"	" H s in 6 "
77.	8	"	"	"	"	" H s in 18 "
78.	4	"	"	"	"	" H s in 3 "
79.	6	"	"	"	"	" H s in 14 "
80.	8	"	"	"	"	" H s in 12 "
81.	3	"	"	"	"	" H s in 3 "
82.	5	"	"	"	"	" H s in 9 "
83.	4	"	"	"	"	" H s in 8 "
84.	3	"	"	"	"	" H s in 3 "
85.	4	"	"	"	"	" H s in 7 "
86.	2	"	"	"	"	" H s in 12 "
87.	2	"	"	"	"	" H s in 5 "
88.	3	"	"	"	"	" H s in 3 "
89.	5	"	"	"	"	" H s in 10 "
90.	6	"	"	"	"	" H s in 11 "
91.	13	"	"	"	"	" H s in 30 "
92.	4	"	"	"	"	" H s in 28 "
93.	9	"	"	"	"	" H s in 11 "
94.	11	"	"	"	"	" H s in 23 "
95.	4	"	"	"	"	" H s in 3 "

96.	3	Bestrahlung, mit je 60 mg Ra/20'	bei H c in 26 Mon.	*)
97.	9	" " " "	" H c in 23 "	*)
98.				
99.				
100.				
101.			" H s	
102.			" H s	
103.			" H s	
104.			" H s	
105.	14	" " " "	" H s in 30 "	*)
106.	7	" " " "	" H s in 11 "	
107.	3	" " " "	" H s in 2 "	
108.	5	" " " "	" H c in 7 "	
109.	4	" " " "	" H c in 3 "	*)
110.	4	" " " "	" H s in 2 "	
111.	5	" " " "	" H c in 6 "	
112.	4	" " " "	" H s in 4 "	
113.	3	" " " "	" H s in 2 "	
114.	3	" " " "	" H s in 9 "	
115.	6	" " " "	" H s in 11 "	*)
116.	2	" " " "	" H c in 1 "	
117.	9	" " " "	" H c in 21 "	
118.	3	" " " "	" H s in 4 "	
119.	4	" " " "	" H in s 2 "	

Es würde zu weit führen, jeden einzelnen Fall genau durchzusprechen. Deshalb nur einige Hinweise auf besonders bemerkenswerte Krankengeschichten.

Bei 2) handelt es sich um ein neunjähriges Mädchen E. L., das in der Mitte beider Unterlider je ein punktförmiges rötlich gefärbtes Haemangiom hatte, rechts größer als links. Das linke Haemangiom heilte schon nach viermaliger Bestrahlung kosmetisch ab, während das rechte Haemangiom trotz zwölfmaliger Bestrahlung in einem Zeiträum von 41 Monaten nach anfänglich guter Ablassung, dann wieder zunehmender Rötung, im Enderfolg nur mit einer guten neutralen Ablassung reagierte.

Zu 8): Die acht Monate alte Patientin M.B. wies an einer an sich rekationslosen Narbe, die von der spina iliaca anterior superior

zum Rippenbogen zog, vier rote Stippchen auf, ferner an der Nasenwurzel ein 0,5 cm langes und 2 cm breites Haemangiom, außerdem noch auf der linken Stirnseite oberhalb des Nasenflügels ein Haemangiom. Alle Haemangiome wurden innerhalb von drei Monaten viermal bestrahlt. Erfolg: Nach jeder Bestrahlung zunächst Rötung (nach Angaben der Mutter), nach drei Monaten kosmetische Heilung aller Haemangiome bis auf ein rotes Stippchen an der Narbe.

Zu 11): Hier handelt es sich um ein einen halben Pfennig großes, erhabenes Haemangiom bei der 6½ Monate alten A. P. in der Nähe der sutura coronalis, das schon einmal vergeblich mit Kohlenäuref Schnee behandelt worden war. Die Radiumbehandlung erzielte eine kosmetische Heilung, die nur leicht durch feine Narben, mit denen das Kind in die Bestrahlung kam und die nach Aussage der Mutter Folgen der Kohlenäuref Schneebehandlung seien, beeinträchtigt wurde.

Zu 14): Zwei erbsengroße Haemangiome am linken Orbitalrand bei der 7 Monate alten Patientin G. G. wurden gleichzeitig bestrahlt. Nach der zweiten Bestrahlung bildete sich über den beiden Haemangiomen ein kleiner Schorf. Bis zur vollständigen Abheilung des Schorfes unterblieb die Weiterbestrahlung. Enderfolg: Kosmetische Heilung.

Zu 22): Bei der sechs Monate alten Patientin E. J. fand sich in der linken Supraclaviculargrube eine 1,5 cm lange Narbe. Am ersten Drittel der Narbe befanden sich zwei typisch dunkelrote Haemangiome. Das letzte Drittel der Narbe war verdickt und bläulich verfärbt. Außerdem wies am rechten Oberarmgelenk eine 5-Markstück große Stelle 3 bis 4 bläulich verfärbte, erhabene Stellen auf. In der Oberflügelbeingrube war zunächst die operative Entfernung des hier sitzenden Haemangioms versucht worden mit anfänglich gutem Erfolge. Dann zeigten sich die schon geschilderten Veränderungen an der Narbe. Die Frage, ob es sich hier um ein echtes Rezidiv handelt, oder um einen an sich vollständig haemangiomatös verbildeten Hautbezirk, den nur teilweise normal aussehende Epidermis überzog und der sich nun nach der Operation aus zunächst unbekannter Ursache heraus auch als Haemangiom neben gefunder Haut manifestierte, muß zunächst unbeantwortet bleiben. Wahrscheinlich ist letzteres der Fall. Die Radiumbehand-

lung war zunächst sehr erfolgreich. Dann bildeten sich kleine Gefäßreiserchen in der ganzen oberen Schlüsselbeingrube, ähnlich einem spinnförmigen Mal. Diese Reiserchen wurden energisch bestrahlt, zunächst mit negativem Erfolg. Erst nach acht Monaten zeigte sich wieder Erfolg, „fast sprungartig“ nach Aussage der Eltern. Erhebliche Rückbildung trat ein. Lediglich kleine Teleangiektasien blieben bestehen, die jeder weiteren Behandlung trotzen. Die kleinen haemangiomatösen Veränderungen am rechten Oberarmgelenk reagierten mit einer ziemlich guten Abheilung auf die Einwirkung der Radiumstrahlen.

Zu 23): Der siebeneinhalb Monate alte Patient P. J. verletzte sich nach der vierten Bestrahlung. Die Wunde streifte teilweise das Haemangiom. Die Bestrahlung wurde bis zur völligen Heilung der Wunde ausgesetzt und erst danach wieder aufgenommen. End-erfolg: ziemlich gute Heilung.

Zu 32): Bei der Patientin P. S. fanden sich zwei Haemangiome deselben Bautyps, eines unmittelbar unter dem linken Auge, das andere an der rechten Hand. Nach den ersten Bestrahlungen begann das Haemangiom am Auge gut abzublassen, während sich das Haemangiom an der Hand zunächst sehr wenig strahlenempfindlich zeigte. Dann verschwand das Haemangiom an der Hand vollständig, während das Haemangiom unter dem linken Auge nach Abschluß der Behandlung nur unvollständig abgeblaßt war.

Es folgt nun ein unverhältnismäßig hoher Prozentsatz von Patienten, deren Haemangiome vor der Behandlung oder während der Behandlung Veränderungen, wie Zunahme des Farbtons, Bläschenbildung, Ulcerationen durchgemacht haben, oder die nach Abschluß der Behandlung kleinere Veränderungen, wie Narben, Leukoplakien davontrugen. Besonders erwähnenswert sind:

40): Hier zeigte sich nach der ersten Bestrahlung Krustenbildung. Während kurzer Bestrahlungspause glatte Abheilung. Dann Weiterbestrahlung. Endergebnis: hervorragende Abblaffung.

42) Bei der dritten Bestrahlung gab die Mutter der drei Monate alten Patientin J. P. an, daß sich kurz nach der zweiten Bestrahlung über dem Haemangiom kleine Bläschen gezeigt hätten, aus der sich klare Flüssigkeit entleert habe (?). — Das Haemangiom

vertrug alle weiteren Bestrahlungen ausgezeichnet. Enderfolg: Hervorragende Abblaffung.

48) Bei der zweieinhalb Monate alten Patientin H. E. wies das Haemangiom vor der dritten Bestrahlung dick brockigen Schorf auf. Trotzdem wurde die dritte Bestrahlung vorgenommen. Abheilung des Schorfes. Weitere zwei Bestrahlungen führten zur guten Abblaffung.

49) Hier handelt es sich um eine 24 Jahre alte Patientin mit einem flachen Haemangiom an der lateralen Seite der regio orbitalis. Im Verlauf der ersten sechs Bestrahlungen allmähliches Abblaffen. Dann nach der siebten Bestrahlung ohne erklärliche Gründe plötzlich intensive Zunahme des Farbtons bei völlig normalem Gesundheitszustand (außerhalb der Menfes). Bei der achten Bestrahlung Schorf, der das ganze Haemangiom bedeckte. Dann Abheilung des Schorfes und Abblaffen des intensiven Farbtones. Enderfolg: nach elf Bestrahlungen erhebliche Abblaffung, aber nur geringe Abflachung,

54 und 59): Bei diesen Patienten mußte trotz hervorragend weiterfchreitender Abblaffung die Behandlung unterbrochen werden, bei 54) wegen Leukoplakie und bei 59) wegen Narbenbildung.

57, 60, 81): Drei Patienten kamen mit schon ulcerierten Haemangiomen zur ersten Behandlung. Die Bestrahlung erfolgt auf die gefchwürigen Haemangiome, die die Strahlendosen ausgezeichnet vertrugen. 57) und 60) zeigten gute Abblaffung, während bei 81) nach der dritten Bestrahlung die Behandlung zunächst wegen deutlicher Narbenzeichnung abgebrochen wurde.

73): Die acht Monate alte Patientin M. H. war durch ein ca. 3 cm großes, die Umgebung überragendes Haemangioma cavernosum am äußeren Rand der linken regio orbitalis entftellt. Der Umkreis des Haemangioms war leicht bläulich verfärbt. Während der ersten drei Bestrahlungen in einem Zeitraum von zwei Monaten gut fortfchreitende Abblaffung. Daher zunächst Bestrahlungspause. In der Pause fchwoll die Umgebung des Haemangioms an, gleichzeitig Drüfenschwellung an der linken Halsseite (?). Punktion ergab einige Kubikzentimeter Eiter mit haemolisierenden Streptokokken. Nach der vierten Bestrahlung Durchbruch der Drüfenschwellung nach außen. Nach Schluß der Fistel Weiterbestrahlung. Enderfolg nach der fechften Bestrahlung: erhebliche Abblaffung.

82) Die Patientin G. M. litt an einer Haemangiomatosis, könnte man sagen. Am linken Gefäß befand sich ein 5-Markstück großes Haemangiom, das auf die ersten Bestrahlungen mit einer leidlichen Abblaffung reagierte. Dann zeigten sich nach der dritten Bestrahlung narbige Veränderungen um einen zentralen nässenden Defekt. Bis zur Abheilung zunächst keine Bestrahlung. Ergebnis: Erhebliche Abblaffung. Die anderen Haemangiome, nämlich ein zweipfennig-großes an der rechten Lende, ein 1 Pfennig großes über dem Kreuzbein und verschiedene kleinere rote Stellen im Gesicht, vor allem an der Stirnmitte, erreichten durch fünf Bestrahlungen ebenfalls erhebliche Abblaffung.

91) Bei der drei Monate alten Patientin H. B. zeigte das Haemangiom bis zur achten Bestrahlung kaum eine Minderung des Farbtons. Da traten kleine Bläschen auf, die bald wieder glatt abheilten. Jetzt nahm auch der Farbton ab, bis er nach der elften und dreizehnten Bestrahlung wieder intensiver wurde. Enderfolg: kaum Abblaffung.

97): Die fünf Monate alte Patientin A. M. litt an einer erheblich entstellenden, etwa hühnereigroßen bläulichen Schwellung, die die Haut über dem linken Oberkiefer überzog. Den rechten Jochbogen bedeckte eine bläulich schimmernde, weiche, nur wenig erhabene Schwellung. Zunächst zwei Bestrahlungen. Kein Erfolg. Nach der dritten Bestrahlung Krustenbildung. Dann beginnende Rückbildung. Nach drei weiteren Bestrahlungen war das Haemangiom über dem Jochbogen kaum noch zu erkennen, das Haemangiom über dem linken Oberkiefer dagegen kaum abgeflacht und kaum abgeblaßt. Nach weiteren drei Bestrahlungen wohl fort schreitende Abblaffung, aber die Geschwulst war, vor allen Dingen unter dem linken Ohrläppchen, noch deutlich erkennbar, besonders beim Schreien des Kindes. Nach einer weiteren Bestrahlung tritt Bräunung auf. Entstellung durch Leukoplakien. Ergebnis: Hervorragende Abblaffung an einem Haemangiom. Anfänglich langsam zunehmende Verkleinerung und Abblaffung des anderen Haemangioms. Dann Stillstand des Heilprozesses. Etwas Entstellung durch Bräunung und Leukoplakien.

101, 104): Die Technik der Moulagebehandlung ist auf S. 14 bereits geschildert. Bis jetzt sind an unserer Klinik elf Moulagen angefertigt worden, davon sind fünf noch nicht auswertbar, da die

Behandlung eben erst begonnen hat. Zwei Moulagen sind zur Behandlung von Lymphangiomen der Oberlippe verwandt worden, davon eine schon mit ausgezeichnetem Erfolg. Die Ergebnisse der übrigen vier Moulagenbehandlungen (100—103) sind unterschiedlich. Mehr oder weniger gute Abblaffung. Die Zahl erlaubt keine Schlüsse, so daß über die Ergebnisse der Moulagenbehandlung noch nicht viel gesagt werden kann. Aber die Krankengeschichte eines Patienten verdient doch besonderer Schilderung. Sie stellt in etwa ein Gegenstück zu einem nicht mit Moulage behandelten Fall dar. Beide Fälle sind, was den Sitz, die Bauart und die Ausdehnung des Haemangioms anbetrifft, ungefähr gleich gelagert. In jenem Fall handelte es sich um ein 1 Jahr altes Mädchen, das durch eine über die ganze linke Gesichtshälfte ausgebreitetes Haemangiom schwerstens entstellt war. Der Erfolg einer zweijährigen Behandlungs- bzw. Beobachtungszeit war eine absolut kosmetische Heilung. (Die Krankengeschichte dieser Patientin wird gefondert veröffentlicht werden und ist in dieser Arbeit nicht weiter beachtet.) In diesem Fall handelte es sich um einen Patienten, der neuneinhalb Monate alt, mit einem blassen, flachen Haemangiom, das die ganze rechte Gesichtshälfte überzog, zur Behandlung kam. Die Behandlung erstreckte sich über einen Zeitraum von 55 Monaten!

Zunächst wurde die ganze haemangiomatöse Fläche in 32 Felder geteilt und am ersten Tag (17. 7. 1931) der Behandlung das erste Feld mit 45 mg Ra/30' bestrahlt. Am folgenden Tag wurde Feld 2 mit 45 mg Ra/40' bestrahlt und so fort bis zum achten Tage, dann gleichzeitige Bestrahlung von zwei Feldern, ab zehnten Tag gleichzeitige Bestrahlung von drei Feldern. Pause bis zum 28. 6. 1931, dann abwechselnd Bestrahlung von weiteren Feldern und Bestrahlungspausen. Erst nach 42 Bestrahlungen in einer Zeit von elf Monaten mit langsam ansteigenden Radiummengen und zunehmenden Bestrahlungszeiten, trat eine geringe Abblaffung ein. Nach einer Pause von sechs Monaten wurden unterschiedlich 13 Felder, die besonders wenig abgeblaßt waren, mit wechselnden Radiummengen (50—100 mg Ra) bestrahlt. Zunächst keine Wirkung, dann langsam zunehmende Abblaffung. Gleichzeitig zeigte sich an den Mundpartien ein indifferenter Ausschlag.

Am 13. Juli 1934, also drei Jahre nach Beginn der ersten Behandlung wurde eine nur recht mäßige Abblaffung festgestellt. Jetzt

setzte die Moulagebehandlung ein. Die Moulage war nach der auf S. — ff. angegebenen Technik angefertigt und kontrolliert worden. Die Moulage lieferte in fünf Tagen 400 r. Der Patient vertrug die Moulage reaktionslos. Bei der Nachschau, zwei Monate später, stellte man eine gleichmäßige Abblaffung fest, leider aber auch leichte teleangiektalische Veränderungen. Bei der zweiten Nachschau, wieder sechs Monate später, sah man weitere Abblaffung, aber Rötung war noch deutlich erkennbar. Das an sich zufriedenstellende Ergebnis wurde durch inzwischen deutlicher gewordene teleangiektatische Veränderungen und Narbenbildung stark beeinträchtigt. Später wurden noch einmal zwei besonders auffallende Stellen des Haemangioms teils mit Moulage 2 h, teils mit einfachem Radiumträger behandelt, jedoch ohne weiteren Erfolg. Endergebnis: Mittlere Abblaffung, aber Entstellung durch Narbenbildung. Man ist versucht, hier von einem im ganzen etwas resistentem Haemangiom zu sprechen.

Diese Krankengeschichte gibt auch einige Hinweise für die Indikation der Moulage. Angezeigt erscheint die Moulage in allen Fällen mit flächenhaft ausgedehnten Haemangiomen, bei denen eine Bestrahlung von einzelnen Feldern eines solchen Haemangioms leicht zur Narben- und Streifenbildung an den einzelnen Felldrändern führt. In der Vermeidung solcher Gefahrenmomente liegt zweifellos ein Vorzug der Moulage. Ist die Moulage einmal angefertigt und kontrolliert worden, so vereinfacht sie die Technik der späteren Bestrahlungen. Gewisse Gefahrmomente birgt auch die Moulagebehandlung in sich. So sahen wir einen Fall, bei dem die an sich schöne und gleichmäßige Abblaffung durch deutlich erkennbare breite, weiße Streifen entstellt wurde. Diese Streifen entsprechen genau der Anordnung der Radiumnadeln in der Moulage.

In drei weiteren Moulagebehandlungen ist eine gleichmäßige Abblaffung erreicht worden. Die Behandlung in beiden Fällen geht zur Zeit noch weiter. Da diese Moulagetechnik noch jung ist und bei uns noch wenig angewandt worden ist, liegen noch keine ausgiebigen Erfahrungen vor.

105): Hier handelt es sich um ein bläuliches, leicht erhabenes Haemangiom an beiden Seiten der Nasenspitze bei der fünf Monate alten Patientin K. F. Zunächst gute Abflachung. Der Farbton verlor an Intensität. Nach der achten, neunten, zehnten und elften Be-

Strahlung wieder allmählich zunehmende Rötung in den Randpartien. Nach der zwölften Bestrahlung liegt das Haemangiom schon ziemlich im Niveau der Haut, blaßt auch etwas ab. Im Verlauf weiterer Bestrahlungen treten jedoch Teleangiektasien und Leukoplakien auf. Die Rötung nimmt wieder zu, um dann wieder etwas abzublassen. Wegen der oben genannten Veränderungen kein Radium mehr. Erfolg: Ziemliche Verkleinerung, beeinträchtigt durch leicht teleangiektatische Zeichnungen.

106): Der kleine, sechs Monate alte Patient J. C. litt an einer kleinhandtellergrößen intensiv roten Schwellung mit bläulich durchschimmernden Streifen in Nähe der rechten regio orbitalis. Die Schwellung war nach Ausfagen der Mutter im Anschluß an einen Keuchhusten aufgetreten und schnell gewachsen. Im Verlauf der Behandlung nach fünf Bestrahlungen flachte das Haemangiom vollkommen ab. Der Farbton verlor an Intensität. Dann zog sich das Kind wieder eine schwere Erkältung zu. Im Anschluß daran trat zunehmende Rötung auf. Nach zwei weiteren Bestrahlungen verließ das Kind die Behandlung mit folgendem Status: Haemangiom abgeflacht, im Niveau der Haut erheblich kleiner geworden, noch erkennbare Rötung, leichte Teleangiektasiebildung.

109): Bei dem drei Monate alten G. St. mit einem erbfgroßen 4—5 cm hervorragenden, elastischen Haemangiom mit bläulich durchschimmernder Umgebung trat nach anfänglich guter Verkleinerung nach der dritten Bestrahlung eine Schuppung ein. Nach einer kurzen Pause erfolgte die vierte Bestrahlung. Geringe Abblaffung und anhaltende Schuppung.

115): Die acht Monate alte Patientin R. G. hatte über dem linken Unterkieferast einen etwa 2 cm großen, tiefroten, etwas srhabenen Fleck. Nach drei Bestrahlungen innerhalb von 4 Monaten nur geringfügige Verkleinerung, keine Abblaffung. Dann Krustenbildung. Zwei Monate Pause. Haemangiom fast unverändert. Nach der fünften Bestrahlung geringe Abflachung, die nach der sechsten Bestrahlung langsam fortichreitet. Patientin noch in Behandlung.

117): Bei dem sechs Monate alten Patienten P. G. trat ebenfalls nach Aussage der Mutter im Anschluß an eine Pertussis am rechten Unterlid eine dunkelblaue ca. 7 mm dicke elastische Geschwulst auf. Schon nach der ersten Bestrahlung flachte die Geschwulst ab. Der Farbton blieb. Erst als die Geschwulst schon fast im Niveau der

Haut lag, ging nach der fünften Bestrahlung die bläuliche Farbe in einen etwas mehr rötlichen Farbton über. Nach der neunten Bestrahlung lag das Haemangiom wohl im Niveau der Haut, der rote Farbton aber war fast ganz geblieben, nur geringste Minderung der Flächenausdehnung.

Die Veränderungen, die die Radiumstrahlen an haemangiomatösen Geweben hervorrufen, sind schon dargestellt worden. Es sollen nun auch die makroskopisch sichtbaren Veränderungen, die sich allgemein im Verlauf des Heilprozesses an den Blutgefäßgewebsgeschwülsten gezeigt haben, kurz zusammengefaßt nach Aufzeichnungen in den Krankenblättern und nach eigener Wahrnehmung geschildert werden.

In den Krankenblättern sind die haemangiomatösen Veränderungen möglichst genau beschrieben und evtl. auch photographiert worden. Im Verlauf der Heilbehandlung werden alle Angaben über Behandlungstag, Bestrahlungsdauer, Anzahl der mg Radiumelement, Filterungsart, Verhalten des Patienten, Angaben über interkurrente Krankheiten und über Vorgänge an den Haemangiomen in die Krankenblätter eingetragen. Die Veränderungen an den Haemangiomen zeigen sich einmal in fortschreitenden Abblassungen, die mehr oder weniger die für das Auge erwünschte Heilung herbeiführen. Nach der Abblassungstendenz des einzelnen Haemangioms, d. h. also nach seiner spezifischen Reaktion auf die Radiumstrahlen, richtet sich die Weiterbehandlung. Feststellungen über fortschreitende Abblassungen sind aber subjektiv. Ihre Auswertung sowohl für die Weiterbehandlung, als auch für eine kritische Berichterstattung ist nur mit einer gewissen Zurückhaltung möglich. Praktischen Wert haben solche Feststellungen nur, wenn sie im Verlauf der Behandlung jedes mal von ein und demselben Beschauer getroffen werden, der also vor allen Dingen das Haemangiom mit seinem Farbton schon vor der ersten Bestrahlung beurteilen konnte. Im anderen Falle kommt es infolge der zweifellos individuellen Psychophysik des Sehorgans des jeweiligen Beschauers unbedingt zu Fehlfeststellungen. Ferner muß der Beschauer, falls er möglichst objektive Feststellungen treffen will, vor jeder Beurteilung die augenblickliche Reaktionslage des Patienten in Betracht ziehen. So kann z. B. ein Haemangiom bei einem sechs Monate alten Patienten,

der schläft oder ruhig ist, hellrötlich aussehen, wehrt der Patient dagegen, preßt oder schreit er, so kann die Geschwulst größer und intensiver dunkelrot erscheinen. Ferner spielen die Temperatureinflüsse eine erhebliche Rolle. Es müssen also, wenn man zu einer möglichst genauen Feststellung kommen will, auch alle Umwelteinflüsse mit in Betracht gezogen werden. Es ist praktisch wohl nicht möglich, sich den jeweiligen Farbton eines jeden Haemangioms einzuprägen. Auch die Aussagen des Patienten oder dessen Angehörige über Farbton und Abblaffung haben nur bedingten Wert. All das erschwert möglichst objektive Feststellungen.

Wenn man nun ähnlich der Haemoglobinskala eine Haemangiomskala schaffen würde, in der so die hauptsächlich vorkommenden Farbtöne der Haemangiome aufgezeichnet sind, so könnte man gleich zu Beginn der Behandlung durch Vergleich eine ziemlich objektive Farbtonbestimmung ermöglichen. Abblaffungsergebnisse würden dann im Verlauf der Behandlung recht anschaulich werden. Ferner würden so gute Registriermöglichkeiten getroffen werden, und Vergleiche mit den Ergebnissen anderer Kliniken erleichtert. Für die Weiterbehandlung könnte man aus den so recht anschaulich gemachten Abblaffungsergebnissen leichter Schlüsse ziehen. Natürlich müssen dann beim Vergleich von Skala und Haemangiom und bei späterer Nachschau die Umwelteinflüsse, so vor allem der Unterschied zwischen Außen- und Zimmertemperatur und die jeweilige Reaktionslage des Patienten in Betracht gezogen werden.

Die allmähliche Abblaffung mag wohl dadurch zustande kommen, daß die Durchblutung infolge Verödung und Verstopfung der Gefäßlumen allmählich zum Stehen kommt. Das Blut wird in den Gefäßen gerinnen. Es bildet sich ein Gerinnungsgerinnfel, das allmählich durch junge Bindegewebszellen durchwachsen wird. Allmählich entsteht so neues, nicht haemangiomatöses Gewebe, wie schon früher beschrieben.

Mit der Abblaffung ist gleichzeitig auch eine Verkleinerung der Blutgefäßgewebsgeschwülste verbunden. Das zeigt sich vor allem an den schwammigen Bildungen. Besonders auffallende Verkleinerungen sahen wir bei den letzten in Tabelle 1) angeführten Patienten, bei denen nun auch das Verhältnis von Größe des Haemangioms zum Heilerfolg näher betrachtet werden soll. Die Verkleine-

runge imponierte weniger mit einer Flächenminderung im Niveau der Haut, als vielmehr mit einer Abflachung dieser Haemangiome, die zum größten Teil das Niveau der Haut etwas überragten, ohne aber in jedem Fall klar den Eindruck des lappigen Gefäßschwammes zu machen.

Zuerst noch ein paar Worte über die übliche Größenbestimmung der Haemangiome. In der Praxis ist man gewohnt, Größenbestimmungen immer im Vergleich zu Dingen des Alltags, wie zu Geldstücken, Früchten usw. zu treffen, so z. B. eine weiche, bläuliche Geschwulst von etwa Walnußgröße oder: roter Fleck von etwa Pfenniggröße. Diese Bezeichnungen sind natürlich höchst ungenau, haben aber doch den Vorzug, daß sie unterschiedlich festlegen und recht augenscheinlich machen, ob es sich etwa um ein im Niveau der Haut so und so weit ausgedehntes Haemangiom oder um ein in der und der Form sich über das Niveau der Haut erhebendes Haemangiom handelt oder auch, inwieweit beides miteinander verbunden ist. In der nun folgenden Tabelle 2) ist versucht worden, diese 19 Haemangiome so zusammenzustellen, daß die Pfeilrichtung eine Größenzunahme des Haemangioms angibt. Ferner sind die üblichen Größeneinteilungen gewählt, wie Stecknadelkopfgröße etc. Findet sich unter dieser Rubrik ein Strich, so läßt sich eine Vergleichsform für die Größe des Haemangioms nicht finden, das Haemangiom paßt aber seiner Größe entsprechend an die jeweilige Stelle. Anzahl der Bestrahlungen, etwa drei und Behandlungsdauer z. B. vier Monate, ist angegeben wie 3/4. Im übrigen wie Tabelle 1.)

Tabelle 2.

1. 1 stecknadelkopfg.	H s mit 4/4	ergab geringe Verkleinerung
2. 2 „	H s mit 14/30	ergab zieml. „
3. 1 linfengroßes	H s mit 3/2	ergab geringe „
4. 1 „	H s mit 3/2	ergab zieml. „
5. 1 „	H s mit 4/2	ergab kaum „
6. 1 erbfigroßes	H c mit 4/3	ergab zieml. „
7. 1 „	H s mit 3/9	ergab geringe „
8. 1 „	H c mit 3/3	ergab gute „
9. 2 ca. 1-Pfg. großes	H c mit 6/9	ergab gute „
	↓ H s mit 6/9	ergab gute „

10. 1 —	H s mit 4/2	ergab zieml.	„
11. 2 ca. 10-Pfg.großes	H s mit 7/11	ergab zieml.	„
12. 1 „	H c mit 2/1	ergab geringe	„
13. 2 mandelgroße	H c mit 5/6	ergab zieml.	„
14. Verdick. d. Zunge	H s mit 3/4	ergab kaum	„
15. 1 —	H s mit 2/2	ergab gute	„
16. 2 —	H s mit 6/11	ergab geringe	„
17. 1 —	H c mit 9/35	ergab zieml.	„
18. 2 hühnerei- und mandelgr.	H c mit 9/21	ergab kaum	„ kosmet. Heilung
19. 1kleinhandtellergr.	H c mit 8/15	ergab ausgezeichnete	Verklein.

Vergleicht man nun nach Tabelle 2) die Größe der Haemangiome mit dem Bestrahlungserfolg, so kommt man zu der Feststellung, daß offenbar die Größe der Haemangiome nicht den absoluten Einfluß auf den Heilprozeß hat, daß man sagen könnte: größere Haemangiome heilen schlechter als kleinere. Faßt man alle Haemangiome, die die positive Strahleneinwirkung gezeigt haben, zusammen und setzt auch hier die Größe des Haemangioms im Vergleich zu dem Heilerfolg, so kann man zu folgenden Schlüssen kommen:

1. Stecknadelkopfgroße Haemangiome sprechen im allgemeinen schlechter auf Strahlen an als
2. Haemangiome von umschriebener Größe, die durchschnittlich besser auf Radium reagieren, als
3. Haemangiome in flächenhafter Ausdehnung, die etwa eine ganze Gesichtshälfte überziehen.

Die Frage, warum reagieren kleinste Haemangiome schlechter, kleine und mittlere besser, flächenhaft ausgedehnte wieder schlechter, dürfte zum Teil durch unzureichende Applikationsmöglichkeiten und zum Teil durch den Bau der haemangiomatösen Bildungen erklärbar sein.

Rein technisch betrachtet erscheint es schwierig, an ein sehr kleines Haemangiom eine ausreichende Menge Radiumelement zu bringen, möglichst auch unter Vermeidung von Radiumschädigungen der benachbarten gesund aussehenden Hautpartien, als an ein Haemangiom von mittlerer Größe.

Der Gedanke, daß die Streuzufätze, deren Einfluß auf den Heilprozeß schon ausführlich geschildert wurde, bei Haemangiomen von mittlerer Größe intensiver sind, als bei diesen kleinen Haemangiomen, liegt nahe.

Mittlere und auch größere Haemangiome sind technisch gut mit Radiumstrahlen angreifbar. Sehr schwierig wiederum ist eine gleichmäßig intensive und ausreichende Bestrahlung von flächenhaft ausgedehnten Haemangiomen, die etwa eine ganze Gesichtshälfte überziehen. Auf die hier drohenden Gefahrenmomente ist schon hingewiesen. Möglich, daß hier eine sorgfältig ausgeführte Moulagebehandlung später einmal auch so gute Erfolge zeigen wird, wie sie bei den Haemangiomen von mittlerer Größe im allgemeinen erzielt werden.

Es ist bekannt, daß die Radiumsensibilität der Geschwulstzellen parallel ihrer Wachstumstendenz geht. Von einer Wachstumstendenz kleinster und kleiner Haemangiome kann man wohl im allgemeinen nicht sprechen. Ferner gaben die Mütter der Kinder, die mit solch kleinen Haemangiomen behaftet waren, meist an, daß die „roten Stippchen“ angeboren gewesen und nach der Geburt nicht sonderlich gewachsen seien. Diese einfachen Haemangiome reagieren durchschnittlich schlechter als die meist erst post partum entwickelten schwammigen Haemangiome, die also wohl aus jüngerem Gewebe bestehen und entsprechend strahlenempfindlicher sind als die kleinen, einfachen Haemangiome. Bei den flächenhaft ausgedehnten, meist auch angeborenen Haemangiomen, bestehen dieselben Verhältnisse. Sie sind meist den Naevi flammei zuzurechnen, die, wie auch das Schrifttum berichtet, meist recht träge auf Radiumwirkungen reagieren. — So dürften die Feststellungen über das Verhältnis von Größe des Haemangioms zum Heilerfolg vielleicht erklärbar sein. Der Vergleich von Größe eines Haemangioms zum Heilerfolg leitet über zu einer Betrachtung weiterer Faktoren, die Ursache für die Unterschiede bei den Heilerfolgen sein können.

Der Sitz der Blutgefäßgewebsgeschwülste scheint keine besondere Rolle gespielt zu haben, auffallend ist jedoch der ausgezeichnete Heilerfolg bei drei weiblichen Patienten mit einem Haemangioma circumscriptum multiplex in perigenitaler Anordnung.

Auf die Größe des Haemangioms ist schon eingegangen worden. Am Anfang der Arbeit war eine Einteilung vorgeschlagen

worden, die eine Übersicht über die unterschiedliche Strahlenreaktion einzelner Haemangiome bei ein und demselben Patienten vermitteln sollte.

Entsprechend dieser Einteilung entfallen:

auf die 1. Gruppe: 90 Patienten, mit einem Haemangiom,

auf die 2. Gruppe: 28 Patienten, mit mehreren Haemangiomen.

Sie verteilen sich:

Auf a): Zehn Patienten, mit einem zentralen oder einem oder mehreren, diesen benachbart liegenden Haemangiomen. Darunter neunmal gleichmäßiger Heilerfolg bei gleichgebauten und im allgemeinen auch gleichgroßen Haemangiomen. Einmal unterschiedlicher Heilerfolg.

Auf b): Acht Patienten, mit mehreren gleichgroßen Haemangiomen an umschriebener Stelle: darunter siebenmal gleicher Heilerfolg. Davon zeigten sechs Patienten Haemangiome von gleichem Bautyp. Einmal zeigte sich ungleicher Heilerfolg bei Haemangiomen verschiedenen Bautyps.

Auf c): Drei Patienten, mit je einem Haemangiom an symmetrischen Stellen. Darunter dreimal ungleicher Heilerfolg. Die kleineren Haemangiome heilten besser ab, als die größeren.

Auf d): Sieben Patienten, mit Haemangiomen, die getrennt über die gesamte sichtbare Körperoberfläche einschließlich der sichtbaren Schleimhäute mit Ausnahme der Cornea verteilt sind. Darunter dreimal gleiche, viermal unterschiedliche Heilung.

Diese Zusammenstellung berichtet also über Heilerfolge bei 28 Patienten, die mit mehreren Haemangiomen behaftet waren. Sofern diese Zahl Schlüsse erlaubt, scheint es so zu sein, daß bei Patienten mit mehreren Haemangiomen gleich groß und gleichgebaute Haemangiome gleich gut auf Radiumstrahlen ansprechen, daß dagegen kleinere Haemangiome besser und schneller zu beeinflussen sind als größere.

Einen großen Einfluß auf den Heilverlauf hat aber die Bauart der Blutgefäßgewbgeschwülste. Die besten Heilerfolge sind bei der Behandlung der schwammigen Blutgefäßgewbgeschwülste erzielt worden. Auffällig ist auch das gehäufte Vorkommen dieser

Bildungen im ersten Teil der Tabelle 1). Unter den kavernösen Haemangiomen hat gerade das Angiofibroma circumscriptum multiplex, wie schon erwähnt, auffallend gut reagiert. Die einfachen Blutgefäßgewebsgeschwülste reagieren sehr unterschiedlich. Das rote Feuermal und das spinnenförmige Angiom spricht nicht besonders gut auf die Strahlenwirkung an.

Die Blutgefäßgewebsgeschwülste, die noch vor der ersten Bestrahlung gewachsen waren, haben am besten auf die Strahleneinwirkung reagiert. — Das leitet über zu einer kurzen Betrachtung über das Alter der Patienten. In Tabelle 3) ist eine Übersicht gegeben.

Tabelle 3.

Im Säuglingsalter waren	93 Pat.
Im Kleinkindsalter waren	6 „
Im schulpfl. Alter waren	10 „
Im Alter über 14 J. waren	4 „
Im Alter über 21 J. waren	6 „

Die Pfeilrichtung zeigt im Durchschnitt ein Schlechterwerden des Heilenderfolges an. Je früher also Patienten mit Blutgefäßgewebsgeschwülsten in die Strahlenbehandlung kommen, um so besser ist auch der Enderfolg. Die besten Erfolge sind bei Säuglingen erzielt worden, die kurz nach der Geburt bestrahlt worden sind, und hier wieder an Haemangiomen, die erst nach der Geburt durch ihr Wachstum aufgefallen waren.

Es bleibt nun noch die Gruppe mit der negativen Strahleneinwirkung zu besprechen:

Sie umfaßt in ihrer ersten Hälfte die Krankengeschichten von 7 Patienten. In der zweiten Hälfte sind noch einmal alle Patienten zusammengefaßt, bei denen im Verlauf der Behandlung Schädigungen offenbar durch Radium, neben der eigentlichen Heilwirkung, aufgetreten sind, die aber nur in wenigen Fällen den Enderfolg dauernd beeinträchtigt haben und meist im Verlauf der Behandlung wieder abgeklungen sind.

Im gewissen Sinne strahlenresistent haben sich im ganzen nur vier Haemangiome verhalten. Wir verstehen unter Strahlenresistenz ein durch Radium nicht beeinflussbares Verhalten, so daß sich, makroskopisch betrachtet, an dem Zustandsbild eines Haemangioms keine Rückbildungsvorgänge oder Umwandlungen zur normalen Haut hin erkennen lassen. Ein Persistieren eines noch vor der ersten Bestrahlung gewachsenen Haemangioms müßte man — streng genommen — vielleicht noch einer positiven Strahleneinwirkung zuschreiben. Aber die Frage, ob ein solches Haemangiom aus sich selbst, auch ohne den Einfluß der Radiumtherapie sein Wachstum eingestellt hätte, muß offen bleiben. Wir konnten, wie auch das Schrifttum berichtet, durch Befragung der Patienten oder deren Angehörigen, hin und wieder mal hören, daß nach anfänglicher Vergrößerung des Haemangioms meist entsprechend dem Wachstum des Patienten es auch mal zu früheren Rückbildungsvorgängen an dem Haemangiom ohne Einfluß einer Therapie gekommen war, daß dann aber im Rückbildungsprozeß ein Stillstand eingetreten war. In einigen Fällen erzählten die Mütter der Patienten von ebenfalls mit Haemangiomen behafteten Familienangehörigen, daß er bei diesen zu einer Abheilung gekommen sei, ohne „Doktorei“. Nur seien „Flecken und Stränge“ zurückgeblieben. U n n a u. a. berichtete von spontanen Involutionen von Haemangiomen und nennt in diesem Zusammenhang gerade die *Naevi flammei* und *Naevi aranei et serpiginosi*, die oft mit Radium am schwersten zu beeinflussen sind. U n n a führt solche spontanen Heilungen auf die mit dem Größenwachstum sich vermehrende Spannung über Knochenflächen zurück. Gar nicht selten sollen auch fieberhafte Erkrankungen Selbstheilung herbeiführen. Hiervon konnten wir uns nicht überzeugen. Wir stellten im Gegenteil in einigen Fällen, bei denen infolge einer zweifellos auch fieberhaften Erkrankung die Bestrahlungsbehandlung unterbrochen wurde, eher eine zunehmende Rötung fest, als diese Patienten nach Genesung wieder zur Behandlung kamen. Die entsprechenden Krankengeschichten sind schon geschildert.

Thrombose kann zur Verödung führen. Traumen verursachen leicht Ulcerationen. Auf den geschwürigen Zerfall folgt fibröse Narbenbildung, die die Heilung herbeiführen kann, die jedoch meist nicht kosmetisch ist, da nicht selten deutlich sichtbare atro-

phisch narbige Veränderungen zurückbleiben. Die Ulcerationen und die sonstigen Veränderungen, die im Verlauf der Behandlungen aufgetreten waren, haben wir wiederholt gestreift. In den meisten Fällen warten wir die Ausheilung solcher Defekte erst ab, um dann mit der Bestrahlung fortzufahren. Wir befürchten durch oben geschilderte Prozesse eine Beeinträchtigung des Enderfolges und vermeiden daher peinlichst auch jede Oberflächenverletzung der Haemangiome durch Behandlungstechnik. Denkbar ist jedenfalls, daß autonome Involution mit Strahleneinwirkung zusammenfallen kann, daß sich also beides addiert und so einen Wachstumsstillstand herbeiführt an Haemangiomen, die noch im Wachstum begriffen waren, als sie zum ersten Male bestrahlt wurden. Noch im Wachstum begriffene Haemangiome reagieren aber fast immer gut auf Radiumstrahlen. Von einem ausgesprochenen Wachstum noch vor der ersten Bestrahlung bei diesen vier Haemangiomen ist uns nichts bekannt. Gegen die Auffassung dieser vier Haemangiome als Strahlennegativ könnte sprechen, daß sie alle nur wenig bestrahlt worden sind und die Behandlungsdauer zu kurz ist, um über ihre Reaktionsweise etwas ausfragen zu können. Auch andere Haemangiome haben sich, wie bereits geschildert, oft recht lange strahlenresistent gezeigt. Was aber bei diesen vier Haemangiomen besonders auffällig war, ist, daß sie zunächst auch nicht eine Spur von Radiumeinwirkung gezeigt haben, so daß die Strahlenbehandlung als wirkungslos abgebrochen wurde. Tabelle 4) vermittelt eine Übersicht.

1. 2 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' in einem halben Monat auf 1 $\frac{1}{2}$ cm großes Haemangiom cavernosum am os ischii.
2. 3 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' in 5 Monaten auf einen dunkelroten Fleck am rechten Beckenkamm.
3. 3 Bestrahlungen mit 60 mg Ra/20' in zwei Monaten auf ein 1 $\frac{1}{2}$: 3 $\frac{1}{2}$ cm großes Haemangiom cavernosum am Augwinkel.
4. 4 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' in einem Monat auf ein erbsengroßes Haemangiom an rechter Nasenseite.

Tabelle 4.

Nach den schon früher dargelegten Überlegungen erschien aber eine spätere Rückbildung, also lange nach Abschluß der eigentlichen Behandlung nicht ganz ausgeschlossen zu sein. Nachträgliche Anfrage bei den vier Patienten ergab nun folgendes Resultat:

Beim ersten Patienten war die Blutgefäßgewebsgeschwulst kurz nach Abbruch der vergeblich erscheinenden Bestrahlung exstirpiert worden. Schon zwei Monate später nach der Operation tauchten in der Umgebung der alten Operationsnarbe neue bläulich rote Flecken auf, die erneut mit Radium behandelt wurden, und zwar zunächst mit gutem Erfolg. Es trat eine gleichmäßig fortschreitende Abblaffung auf. Da erfolgte plötzlich der Exitus, nach Angaben der Mutter als Folge einer Hirnblutung.

Beim zweiten Patienten hat sich zunächst überhaupt keine sichtbare Wirkung der Radiumbehandlung gezeigt. Ein Jahr nach Abschluß der letzten Bestrahlung trat eine welke Hautbildung (?) in der Umgebung der dunkelroten Verfärbung auf, am Haemangiom selbst jedoch hat sich auch nicht eine Spur von Rückbildung zur normalen Haut hin gezeigt.

Die Bestrahlung der Blutgefäßgewebsgeschwulst beim dritten Patienten wurde ebenfalls als zunächst erfolglos abgebrochen, später nach einem Jahr jedoch noch einmal wieder aufgenommen. Endresultat: nur ganz geringe Rückbildung, dann wieder Stillstand.

Der vierte Patient antwortete nicht.

Ein Urteil darüber, ob sich gewisse Blutgefäßgewebsgeschwülste absolut auch schon bei jungen Patienten als strahlenresistent erweisen, läßt sich auf Grund der vorliegenden Ergebnisse wohl noch nicht fällen. Aber eins scheint sicher zu sein: Es gibt zumindest zeitweilig durch Radiumstrahlen fast völlig unbeeinflussbare Haemangiome. So fanden wir z. B. bei vier Patienten eine Strahlenwirkung erst nach drei Bestrahlungen, bei einem Patienten erst nach neun Bestrahlungen, drei weitere Haemangiom-Patienten reagierten auf Radium in der Trägerform überhaupt nicht. Erst die Moulage erzielte hier eine, wenn auch nur geringe, Abblaffung. Bei zwei weiteren Haemangiom-Patienten war zu Beginn der Behandlung ausgesprochene Strahlenresistenz, dann geringfügige Abblaffung, nach weiteren Strahleneinwirkungen wieder Resistenz erkennbar. Diese zehn Haemangiomfälle sind bereits an entsprechender Stelle

geschildert. Ausgesprochene Strahlenresistenz hat sich also nur in drei (+ 1) Fällen gezeigt, außerdem zeitlich begrenzte Resistenz in zehn Fällen.

Zunahme des Wachstums trotz Strahleneinwirkung sahen wir bei drei (5) Patienten. Bei zwei Patienten wurden die Haemangiome nach Einwirkung der ersten Dosen größer. Dann trat Wachstumsstillstand ein. Danach Verkleinerung und Abblaffung. Eine kosmetische Heilung wurde dabei nicht mehr erreicht.

Bei den anderen drei Patienten

1. 3 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' in zwei Monaten auf ein linsengroßes Feuermal unter der rechten Augenfalte.
2. 2 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' auf ein zehnpfennig-großes Haemangiom cavernosum, übergreifend von Innen-seite der Oberlippe auf Oberkiefer.
3. 4 Bestrahlungen mit je 60 mg Ra/20' auf ein einpfennig-großes Haemangiom cavernosum an Hinterhauptschuppe.

Tabelle 5.

konnten wir ständiges Wachstum trotz Strahleneinwirkung feststellen. Die erste Patientin kam nach der dritten Bestrahlung nicht mehr zur Behandlung. Bei der zweiten Patientin war das Wachstum des Haemangioms derartig rapid, daß radikale Exstirpation anempfohlen wurde. Die dritte Patientin zeigte nach zwei Bestrahlungen Zunahme des Wachstums, dann nach der dritten Bestrahlung geringe Abblaffung, nach der vierten Bestrahlung wieder Zunahme in der Flächenausdehnung. Zunächst Abbruch der Behandlung. Nachträgliche Anfrage wurde nur von der letzten Patientin beantwortet. Danach zeigte sich wieder eine gewisse Abblaffung an der Blutgefäßgewebsgeschwulst, gleichzeitig tauchten zuerst oberhalb der Geschwulst verschiedene neue kleine Verfärbungen auf. Patientin steht zurzeit wieder in Behandlung. Die erste Patientin war 36 Jahre, die anderen beiden Patienten drei Wochen alt. Gründe, wie Schwangerschaft, Pubertät, die das Wachstum dieser Haemangiome erklären könnten, fallen fort.

Rezidiv, Entartung und Metastase nach Abschluß der Radiumbehandlung haben wir unter diesen 126 Haemangiom-Patienten, deren Behandlung teils schon vor fünf bis sechs Jahren eingesetzt hat, in keinem Fall bisher feststellen können. Wohl haben wir drei

Patienten zur Behandlung bekommen, bei denen die Behandlung der Haemangiome schon auf operativem und chemischem Wege versucht worden war. Ein chemisch vorbehandeltes Haemangiom kam mit zarten Narben, herrührend von einer Kohlensäurebehandlung zur Bestrahlung, durch die nachträglich — wie schon angeführt — noch eine kosmetische Heilung erreicht wurde. Bei zwei operativ vorbehandelten Haemangiomen wurde keine kosmetische Heilung mehr erreicht. Bei beiden Haemangiomen mag es sich wohl um Fortwuchern von bei der Operation stehen gebliebener, nur gesund aussehender, in Wirklichkeit aber angiomatöser Gewebsteile in Nachbarschaft des eigentlichen Haemangioms gehandelt haben.

Kosmetisch ausgesprochen ungünstige Folgen der Radiumeinwirkung haben wir nur bei zwei Patienten feststellen können, einmal bei einem mit Moulage behandelten Patienten, dessen Krankengeschichte schon ausführlich geschildert worden ist. Den Sitz des früheren Haemangioms überziehen jetzt landkartenartig angeordnete bräunlich-rote Flecken, durch weißliche Narben voneinander getrennt. Bei den anderen Patienten erzielte die Bestrahlung an einem fünfmarkstückgroßen Haemangiom an der rechten Schläfenseite zwar eine Abblässung, aber am Schluß der Behandlung wirkten an der rechten Schläfe weißlich-rote Flecken, durchzogen von Teleangiektasien und Narben, doch entstellend.

Kleinere, nicht entstellende Veränderungen nach Abschluß der Behandlung mußten wir bei acht Patienten feststellen, und zwar:

Rötung	1mal *)
Bildung von weißl. Flecken . . .	2mal *)
Leukoplakien	2mal
Schuppung	1mal
Narbenbildung	2mal
Teleangiektas. Veränderung . . .	4mal

Im Verlauf oder als Folge der Behandlung (?) traten ernsthaftere Komplikationen überhaupt nicht auf. Schädigungen vorübergehender Art sahen wir in sieben Fällen, und zwar:

Rötung	5mal *)
Blasenbildung	4mal *)
Nässende Stellen	2mal *)
Ulcerationen	3mal *)
Schorfbildung	7mal *)

Narbenbildung	2mal *)
Leukoplakien	6mal *)
Schuppung	1mal
Teleangiektasien	4mal

*) gleichzeitig auftretend.

Die Frage, ob diese kleinen Schäden Folgen der Radiumstrahlen waren, oder ob sie auch ohne Radiumbehandlung aufgetreten wären, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden. Sie leitet schon zur Schlußbetrachtung über. Nahe liegt jedenfalls der Gedanke, daß sowohl Radiumstrahlen, als auch exogene und endogene Einflüsse zu den oben aufgeführten Veränderungen geführt haben. Behandelte und unbehandelte Haemangiome sind sekundären Veränderungen ausgesetzt. Als Folge von exogener und selten auch endogener Infektion oder mechanischer Irritation können ulceröse und phlegmonöse Prozesse auftreten. Hyperkeratosenbildung ist möglich. Ferner kann Thrombose — vor allen Dingen in kavernenösen Haemangiomen — auftreten und zur Cystenbildung führen, die sich bei mechanischen Insulten als nässende Defekte manifestieren. Ferner ist Cystenbildung durch stärkeres zirkuläres Wachstum der Gefäßwände und durch Blutergüsse in das interstitielle Gewebe möglich. An diese Vorgänge kann sich Narbenbildung anschließen. Teleangiektasien können auch nach partieller autonomer Abheilung eines haemangiomatösen Gebildes zurückbleiben. Ferner ist Leukoplakiebildung als Folge chronischen Reizes, bei dem das Epithel verhornt und verdickte Platten mit starker subepithelialer Infiltration gebildet werden, möglich.

Das sind Veränderungen, denen Haemangiome ständig auch ohne Radiumeinwirkung ausgesetzt sind, die in seltenen Fällen bei Entzündungen z. B. zu vegetierender Pyodermie mit letaler Sepsis, in anderen Fällen zu entstellender Narbenbildung, bisweilen auch zu autonomer Heilung führen können. Gleichzeitig kann das Radium, wenn man sich noch einmal die schon geschilderten Strahlenwirkungen vergegenwärtigt, die oben angegebenen Veränderungen bezüglich Thrombose, Cystenbildungen, Gefäßwandveränderungen etc. und deren Folgen, wie Narben, Gefäßreißerchenbildung etc. verstärken, auslösen, so daß vielleicht Radiumeinwirkung und autonome Umwandlungen zu den besprochenen Veränderungen an den Haemangionen im positiven und negativen Strahlen Sinne geführt haben.

Wenn nun spontane Heilungen möglich sind und Haemangiome nur in den seltensten Fällen lebensbedrohend werden, warum dann überhaupt soviel Mühe auf die Heilung dieser Bildungen verwenden?

Es gibt grundsätzlich wohl zwei Gesichtspunkte, aus denen heraus die umfangreiche Therapie der Haemangiome entwickelt worden ist: einmal Verhinderung, daß durch irgendwelche Vorgänge an den Haemangiomen Lebensgefahr für den Haemangiomträger entsteht und zweitens Ausmerzung der kosmetischen Nachteile, die solche Bildungen dem damit behafteten Patienten bringen.

Auf die Gefahren, die die Entzündung der Haemangiome mit sich bringen kann, ist schon hingewiesen. Aus Haemangiomen, vor allem an Schleimhäuten, sind foudroyante Blutungen möglich. Sie können zur sekundären Anaemie und in seltenen Fällen zum Exitus führen. Lebensbedrohend kann ein schnell wachsendes Haemangiom auch durch seine Lokalisation werden, ohne in seinem Bau an sich bösartig zu sein. Obwohl Haemangiomen fast immer gutartige Bildungen sind, können sie plötzlich schnell wachsen und große Flächen eines Körperteils einnehmen, während sie ursprünglich vielleicht nur erbsengroß gewesen sind. Bei solch plötzlichem rapidem Wachstum und auch sonst muß man jedenfalls damit rechnen, daß die an sich gutartigen Haemangiome auch mal atypisch werden können. Es entsteht das Haemangioendothelioma malignum, das infiltrierend wächst und auf andere Organe übergreift, besonders gern auf Speicheldrüsen, Schilddrüse und Leber. Schon bei sehr geringer Atypie sind Metastasen beobachtet worden (B o r m a n n). In all diesen Fällen, also bei Entzündungen mit phlegmonösen Prozessen, erheblichen Blutungen, besteht absolute Indikation zum operativen Vorgehen. Dann ist Radium kontraindiziert. Nur durch diese Komplikationen, die seltene Ausnahmen sind, wird der Indikationsbereich des Radiums begrenzt, so daß man wohl sagen kann, daß die Radiumbehandlung der Haemangiome fast in jedem Fall indiziert ist, vorausgesetzt, daß eine zur Behandlung ausreichende Zeitspanne zur Verfügung steht.

Damit ist auch gleichzeitig der große Nachteil der Radiumtherapie bei Haemangiomen erwähnt: die lange Behandlungsdauer. Auf diese müssen die Patienten vor Beginn der Behandlung hingewiesen werden. Doch dieser Nachteil gleicht sich sofort aus, wenn man die

Ergebnisse der Radiumbehandlung von Haemangiomen mit den Ergebnissen der anderen Behandlungsmethoden (chirurgisch, chemisch, physikalisch) vergleicht. Die Behandlung der Haemangiome verfolgt ja zwei Ziele: Verhinderung von Komplikationen und in der Hauptsache aber das kosmetische Ziel, Befreiung von erheblichen Entstellungen, die bei dem Haemangiomträger oft genug Ursache von Minderwertigkeitsgefühlen sind. Die schonendste Therapie ist — mit Vorsicht angewandt — wohl die Radiumtherapie. Sie ist schmerzlos und bringt die besten kosmetischen Erfolge, wie auch das Schrifttum berichtet (Baentisch, Forßell, Holfelder u. a.). Vergleicht man die chirurgischen Methoden, nämlich hauptsächlich Gefäßligatur und radikale Exstirpation mit unserer Bestrahlungstechnik, so ergeben sich folgende Erwägungen: Die chirurgische Behandlung beansprucht nur eine kurze Behandlungszeit und verhindert meistens Rezidivbildung. Oft jedoch verbieten Sitz, Größe und Vielheit der Haemangiomen schon an sich den chirurgischen Eingriff. Durch postoperative Narbenentstehung und deren Folgen ist häufig der kosmetische Erfolg der operativen Behandlung von Haemangiomen in Frage gestellt. Nicht gar so selten tauchen gerade neben Operationsnarben später wieder kleinere Haemangiome auf, offenbar aus einem haemangiomatösen Bezirk, der bis zur Operation latent geblieben war. Diese Nachteile — die allerdings bei den oben erwähnten Komplikationen in Kauf genommen werden müssen — umgeht unsere Bestrahlungstechnik, die jeden Oberflächendefekt peinlichst zu vermeiden sucht. Das Radium bewirkt eine paraembryonale Metaplasie des Gefäßbindegewebsapparates, so daß am Ende des Prozesses bei richtiger vorsichtiger Dosierung allmählich neues, nicht haemangiomatöses Gewebe herangereift ist, dessen Entwicklungsstufen wir schon früher verfolgt haben. Kontraindiziert erscheint die Radiumtherapie auch schon bei nicht erheblich ulcerierten Angiomen, da bei diesen Angiomen durch Radiumbestrahlung die Gefahr der weiteren und tieferen Zerstörung erhöht wird, die von einer später kosmetisch sehr störenden Narbenbildung gefolgt sein kann. Ätzmittel dringen oft nicht nur in das haemangiomatöse Gewebe ein, sondern auch in das gesunde Gewebe. Die Resultate hierbei wie bei der Injektionsbehandlung, die zur Verödung führen soll, und bei der Einführung von Magnesiumpfeilen um Gewebsreiz mit Blutgerinnung auszulösen, sind wenig befriedi-

gend. Von den physikalischen Heilmethoden erzielt die thermische Methode in Form der Kälteeinwirkung mittels Chloraethylpray oder vor allem in Form der Kohlenäureschneebehandlung noch die besten Erfolge, die aber durch spätere Narbenbildung oft beeinträchtigt werden. Auf die Kälteeinwirkung reagieren besonders gut die flachen Feuermäler und die oberflächlichen jungen Kavernome.

Von den zu therapeutischen Zwecken benutzten Strahlen haben die Radiumstrahlen bisher die besten Erfolge gezeigt. H o l f e l d e r berichtet, daß oft schon kleine Dosen genügen, um großartige Erfolge zu erzielen. Denn die sprossenden Endothelien, aus denen eine Blutgefäßgewebsgeschwulst entsteht, sind sehr strahlenempfindlich und besitzen nur sehr geringe Erholungsfähigkeit. Übereinstimmend berichten viele Autoren, daß alle anderen Methoden in der Therapie der Haemangiome Narben hinterlassen; und vollkommene Heilerfolge selten erzielt werden (S t i c h). Die Narbenentstehung kann auch bei der Radiumbestrahlung nicht mit Sicherheit vermieden werden, doch es lassen sich bei entsprechender vorsichtiger Dosierung und genauester Beobachtung des Heilprozesses durchweg ausgezeichnete Erfolge erreichen.

Fassen wir noch einmal unsere Ergebnisse und Folgerungen zusammen.

Unter 126 mit Radium behandelten Patienten sind 119, die positive Strahlenwirkung gezeigt haben, die also geheilt worden sind; nur sieben Patienten wiesen negative Strahlenwirkung auf, und zwar zeigte sich bei vier Patienten Resistenz, so daß an den Haemangiomen keine Rückbildungsvorgänge zur normalen Haut hin erkennbar waren. Trotz der Strahleneinwirkung sind bei drei weiteren Patienten die Blutgefäßgewebsgeschwülste teils erheblich weiter gewachsen. Nur zwei Patienten sind durch ausgesprochen entstellende Narben geschädigt worden. Komplikationen haben sich überhaupt nicht eingestellt. Ein Ergebnis, das den in der Haemangiomliteratur immer wiederkehrenden Satz: In der Behandlung von Blutgewebsgeschwülsten werden die besten Erfolge mit Radium erreicht, bestätigt.

Folgerungen aus den Ergebnissen:

1. Das für die Behandlung günstigste Alter ist das frühe Säuglingsalter. Hier sind die besten Erfolge erreicht worden, und zwar an Haemangiomen, die erst nach der Geburt ent-

standen waren und noch im Wachstum begriffen waren, als sie zum erstenmal bestrahlt worden sind.

2. Am besten haben die schwammigen Blutgefäßgewebsgeschwülste auf die Radiumeinwirkung reagiert. Offenbar bestehen sie meist aus jüngeren strahlenempfindlicherem Gewebe, als die einfachen meist schon angeborenen Angiome. Die spinnförmig ausgebreiteten Gefäßmäler und die ausgesprochenen Feuermäler scheinen schwer durch Radium beeinflusbar zu sein.
3. Die Größe der Haemangiome scheint nicht absolut maßgebend für den Heilerfolg zu sein, daß man sagen könnte: Kleine Haemangiome heilen generell gut, große generell schlecht. Vielmehr scheint folgende Gesetzmäßigkeit zu bestehen, — allerdings nicht ohne Ausnahme:

Kleinste Haemangiome sind schwerer zu beeinflussen als kleine und mittelgroße Haemangiome, die ihrerseits wieder besser auf Strahlen reagieren, als flächenhaft ausgedehnte Haemangiome.

Hatte ein Patient mehrere Haemangiome, so heilten allerdings die kleineren Haemangiome meist schneller und mit besserem Enderfolg aus, als die größeren Haemangiome.

4. Bei Patienten mit mehreren Haemangiomen lassen sich hinsichtlich einer besonderen Heilungstendenz einzelner Haemangiome, etwa als Folge einer bestimmten Anordnung und Lokalisation keine bestimmten Schlüsse ziehen. Es wurde sowohl gleicher Heilerfolg aller Haemangiome schon während der Behandlung und auch am Schluß der Behandlung festgestellt als auch ungleicher Heilerfolg; letzteres hauptsächlich dann, wenn es sich um Haemangiome verschiedenen Bautyps und verschiedener Größe gehandelt hat.
5. Die besten Bestrahlungserfolge sind dann erzielt worden, wenn sich schon bald nach den ersten Bestrahlungen fortschreitende Abblaffung und Verkleinerung eingestellt hat. Geht der Rückbildungsvorgang ständig weiter — die biologische Wirkung der Radiumstrahlen hält ja sehr lange an —, so erscheint Weiterbestrahlung nicht angezeigt, um auch schon die Möglichkeit, durch Weiterbestrahlung etwa Narben zu setzen, zu vermeiden. Stagniert der Rückbildungs-

prozeß, so scheint vorsichtige Weiterbestrahlung angebracht zu sein. Etwa auftretende Ulcerationen erfordern zunächst konservative Behandlung. Die Bestrahlung ulcerierter Haemangiome hat oft, wenn auch nur unerhebliche Narbenbildung zur Folge. Ausgesprochene Narbenbildung verbietet vorläufig jede weitere Bestrahlung.

6. Der Indikationsbereich des Radiums ist eigentlich unbegrenzt. Nur ulceriert und phlegmonös veränderte Haemangiome, Haemangiome mit torpiden Blutungen und rapidem Wachstum, entartete Haemangiome und natürlich auch Haemangiome mit hartnäckiger Strahlenresistenz lassen die Anwendung von Radium kontraindiziert erscheinen. Sonst können grundsätzlich alle Haemangiome mit Radium behandelt werden. Besonders aber bei flächenhaft ausgedehnten Haemangiomen erscheint die Radiumtherapie das Mittel der Wahl zu werden.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. J a n k e r für die Überlassung des Themas sowie für die freundliche Führung und Herrn Professor Dr. Freiherr von R e d - w i t z für die Übernahme des Referates herzlich zu danken.

Literatur-Verzeichnis.

1. B o r f t : Allgemeine Pathologie der Geschwülste.
 2. R i b b e r t : Die Geschwulstlehre.
 3. Handbuch der speziellen Pathologischen Anatomie und Histologie,
bearbeitet von C. B e n d a — L. J o n e s — J. G. M ö n -
k e b e r g — H. R i b b e r t — K. W i n k l e r .
 4. Handbuch der gesamten Strahlenkunde: Biologie-Pathologie und
Therapie,
herausgegeben von P. L a c a r u s .
II. Band: H. H o l f e l d e r , Die Röntgentherapie der Ent-
zündungen und der Hyperkeratosen,
 5. E l i s. G. E. B o r v e n , Strahlenanwendung in der Nasen-
heilkunde.
 6. Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Geschwülste
der Haut: L e o W e r t h e i m , Haemangiome einschließlich
Teleangiektasie und verwandter Hautveränderungen.
 7. Deutsche Medizinische Wochenschrift. Aus dem Röntgeninstitut
der Chirurg. Universitätsklinik Leipzig. W. B a e n f c h :
Über die Radiumbestrahlung der Haemangiome, M i k u -
l i c e R a d e c k i .
 8. Die Röntgen- und Radiumtherapie in der Gynäkologie (aus
S t ö c k e l , Lehrbuch der Gynäkologie).
 9. Acta radiologica 1921—1935.
 10. Zentralblatt für die gesamte Radiologie, 1926—1933.
-

Lebenslauf.

Ich wurde am 31. Juli 1910 als Sohn des Kaufmanns Heinrich Tünnerhoff und seiner Frau Berta, geb. Peters, geboren. Nach Besuch der Volksschule in Hagen besuchte ich in Hagen und Werl das Gymnasium und bestand in Werl am 4. März 1931 die Reifeprüfung.

Die vorklinischen Semester verbrachte ich in Bonn und bestand dort am 11. 8. 1933 das ärztliche Vorexamen. Im 1. klinischen Semester studierte ich in Bonn, im 2. ärztlichen Semester in Kiel, im 3. in München, im 4.—6. wieder in Bonn.
